

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 24-4-70 051413

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Tél. 60-95-87 et 60-94-91 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3*

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

2ème supplément au bulletin N° 115 d'Avril 1970

21 Avril 1970

page 11

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

Nous rappelons à nos abonnés que les versements effectués après le 28 février 1970 ne peuvent être honorés au titre de l'année 1970, mais sont tenus en instance pour être servis en 1971 sans avoir à subir d'éventuelles augmentations de tarifs.

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - Les traitements effectués avant le 13 avril devront être renouvelés dès réception dans les régions suivantes particulièrement affectées par les pluies des 12 et 13.

AIN: en totalité, sauf 42, 43 et 44

ARDECHE: néant - DROME: 127 et 128

ISERE: régions 106 à 120

LOIRE: 2 et 4 - RHONE: 6, 31, 32, 33, 34 et 36

SAVOIE: en entier - HTE SAVOIE: en entier

Dans les autres cas ou bien renouveler les traitements précédents au bout de 10 à 12 jours en raison de la croissance maintenant plus rapide; ou bien effectuer dès réception le premier traitement sur pommier au fur et à mesure de l'apparition du stade C3 (apparition des parties vertes).

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Poursuivre les traitements conseillés par le bulletin précédent.

XYLEBORE - Les conditions favorables à l'activité de l'insecte ont été réalisées dans les derniers jours, aussi les traitements effectués à partir de ce jour n'auront qu'une efficacité très limitée.

HOPLOCAMPE DU POMMIER - Dans les zones habituellement affectées par cet insecte (trou dans le fruit de la grosseur d'une bille ou galerie et cicatrice circulaires autour de l'oeil) le traitement doit être appliqué dès la chute des pétales.

RAVAGEURS A SURVEILLER - Périèle sur poirier, pucerons vert et cendré du pommier (infestations déjà fortes par endroits).

CULTURES DIVERSES

CHARANCON DE LA TIGE ET MELIGETHE DU COLZA - Ces deux ravageurs ont connu une recrudescence sensible à la faveur des températures élevées de ces derniers jours. En règle générale, le colza n'est plus sensible aux attaques du charançon de la tige et le stade sensible au méligèthe n'est pas encore atteint dans toutes les régions. Nous rappelons toutefois que le (ou les) traitements contre le méligèthe doit se placer entre le dégagement du bouton floral et l'ouverture des premières fleurs.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - OIDIUM DU CASSISSIER - Les premiers traitements devront être entrepris ou renouvelés.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHIQUOT

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P. LATARD